

Systematik der Oriolidae nach

Wolters, H. E. (1979): Die Vogelarten der Erde. 4. Lieferung, Hamburg, S. 244-245

Fam. *Oriolidae* – Pirole

Genus *Oriolus* L., 1766

(Subgenus *Oriolus* L., 1766; syn. *Galbula* Scop., 1777, *Chloreus* Morris, 1837, *Galbulus* Bonap., 1854; incl. *Broderipus* Bonap., 1854 = „*Euchlorites*“ Heine 1859 = „*Broderipornis*“ Math., 1930)

Oriolus oriolus (L., 1758) – Pirol; E: **(Eurasian) Golden Oriole.** – (Syn. *galbula*, *aureus*).

S- und Mittel-Europa (in England nur ausnahmsweise), ostwärts bis W-Sibirien (bis zum Jenissei u. Altai), Vorder-Asien bis Turkestan u. Afghanistan, Indien (ostwärts bis Bihar, südwärts bis Hyderabad u. Mysore).

Subsp. (incl. *kundoo*).

Oriolus auratus Viell., 1817 – Schwarzohrpirol; E: **African Golden Oriole.** – (Syn. *bicolor*, *chryseos*).

Senegal bis S-Äthopien u. Uganda, südwärts durch E-Afrika, E- und S-Zaire u. Sambia bis Angola, zum mittleren Südwestafrika, Bootswana u. N-Transvaal.

Subsp. (incl. *notatus*)

Oriolus chinensis L., 1766 – **Schwarznackenpirol**; E: Black-naped Oriole.

Östl. Himalayagebiet (westwärts bis E-Nepal u. Assam); China nordwärts bis zur Mandschurei; Amur- und Ussurigebiet, westw. bis E-Transbaikalien; Korea, Formosa (Taiwan), Philippinen (einschl. Palawan), Celebes u. benachbarte kleine Ins., Insel Majau (Molukken), Kleine Sunda-Ins. (Lombok bis Alor), Kangean, Bali, Lava, Borneo, Banka, Billiton, Sumatra u. benachbarte Ins., Hinterindien; Nicobaren, Andamanen.

Subsp. (incl. *tenuirostris*, *invisus*, diese beiden von einigen Autoren als besondere Art, *Oriolus tenuirostris* Blyth, 1846 zusammengefaßt und abgetrennt; *diffusus* Sharpe, 1877, = „*indicus*“ Jerd., 1845, nec Daud., 1802, *formosus*, *celebensis*, *maccassariensis*, *broderippii*, *maculatus*).

(Subgenus *Baruffi*s Bonap., 1854)

Oriolus chlorocephalus Shell., 1896 – **Grünkopfpirol**; E: Green-headed Oriole.

Gebirge E-Afrikas von SE-Kenia u. NE-Tansania (Usambara) bis Mocambique (Gorongosa-Berg).

Subsp. (incl. *speculifer*)

Oriolus crassirostris Hartl., 1857 – **Fahlbrustpirol**; E: São Tomé Oriole.

Insel Saão Tomé (W-Afrika)

Oriolus brachyrhynchus Swains., 1837 – **Blauflügelpirol**; E: Western Black-headed Oriole. – (Syn. *baruffi*). (Konspez. mit *Oriolus monacha* ?)

Sierra Leone bis S-Uganda u. W-Kenia, südwärts bis N-Angola, Mittel- u. NE-Zaire.

Subsp. (incl. *laetior*)

Oriolus larvatus Licht., 1823 – **Maskenpirol**; E: Black-headed Oriole. – (Syn. *capensis*)

Vom S-Sudan, S-Äthopien u. Somalia durch E-Afrika, E- u. S-Zaire und Sambia bis Angola, südwärts durch E-Botswana, Rhodesien, Mocambique, Transvaal, den Oranje-Freistaat (ausser W) u. Natal bis zur E- u. S-Kapprovinz.

Subsp. (incl. *rolleti*).

Oriolus percivali Og.-Grant, 1903 – **Bergpirol**; E: Black-tailed Oriole. – (Konspez mit *Oriolus larvatus* ?)

Bergwälder in NE-Zaire, W-Uganda, W-Tansania u. Kenia (Mt. Elgon u. Kenia).

Oriolus monacha (Gmel., 1789) – **Mönchspirol**; E: Forest Oriole. – (Syn. *moloxita*). Äthopien.

Subsp. (incl. *meneliki*).

Oriolus nigripennis Verr. & Verr., 1855 – **Gabunpirol**; E: Black-winged Oriole.

Sierra Leone bis W-Uganda u. S-Sudan; südwärts durch Gabun bis N-Angola u. Mittel-Zaire; Insel Fernando Po.

Subsp. (incl. *intermedius* = „*allenii*“).

Oriolus xanthornus (L., 1758) – **Schwarzkopfpirol**; E: Oriental Black-headed Oriole. – (Syn. *luteolus*, *melanocephalus*).

Ceylon u. Indien, ostwärts durch Burma u. Thailand bis Indochina u. N-Malya; Andamanen; NE-Sumatra; NE-Borneo u. vorgelagerte kleine Inseln.

Subsp. (incl. *ceylonensis*, *maderaspatanus*, *tanakae*).

(Subgenus *Analcipus* Swains., 1831; syn. *Artamia* Geoffr., St.-Hil., 1832, nec. auct., *Ptilocarpus* Müll., 1835, *Erythrolanius* Less., 1840; incl. *Psaropholus* Jard. & Selby, 1838).

Oriolus hosii Sharpe, 1892 – **Mohrenpirol**; E: Black Oriole

Gebirge in Borneo.

Oriolus cruentus (Wagl., 1827) – **Rotbrustpirol**; E: Black-and-crimson Oriole (Crimson breasted Oriole). – (Syn. *sanguinolentus*, *rubropectus*).

Malaya, Sumatra, N_Borneo, Java.

Subsp. (incl. *consanguineus*, *vulneratus*).

Oriolus trilii (Vig., 1832) – **Blutpirol**; E: Maroon Oriole.

Himalayagebiet, ostwärts bis SW-China (Yünnan) u. durch Burma u. N-Thailand bis Indochina; Hainan; Formosa (Taiwan).

Subsp. (incl. *nigellicauda*, *ardens*).

Oriolus mellianus Stres., 1922 – **Seidenpirol**; E: Silver Oriole – (Konspez. mit *Oriolus trilii*?).

Inneres S-China (N-Kwangtung u. Kwangsi bis Szetschwan).

(Subgenus *Xanthonotus* Bonap., 1854)

Oriolus xanthonotus Horsf., 1821 – **Gelmantelpirol**; E: Drak-throated Oriole. – (Syn. *leucogaster*, *castanopterus*).

Malaya, Sumatra (einschl. Mentawi-Ins.), Banka, Java, Borneo, Sulu-Ins., Philippinen.

Subsp. (incl. *cinereogenys*, *samarensis*, *steerii*, + *assimilis*; *Oriolus albiloris* Og.-Grant, 1894, letzterer vielleicht besondere Art und vielfach als solche angesehen).

Oriolus isabellae Og.-Grant, 1894 – **Isabellapirol**; E: Isabella's Oriole.

N-Luzon (Philippinen).

Genus *Mimeta* Vig. & Horsf., 1827

(Syn. *Mimetes* King, 1826, nec *Escholtz*, 1818; *Amimeta* Math., 1913; incl. *neomimeta* Math., 1916)

Mimeta sagittata (Lath., 1801) – **Streifenpirol**; E: Olive-backed Oriole. – (Syn. *viridis*, *striata* Shaw, 1809, nec *Gmel.*, 1788, *variegata* Viell., 1817, nec *Bechst.*, 1811, *meruloides*).

N-Westaustralien, Nordaustralien, N- u. E-Queensland, E-Neusüdwales, Victoria, SE-Südaustralien; S-Neuguinea.

Subsp. (incl. *affinis*).

Mimeta szalayi Mad., 1900 – **Grantpirol**; E: Brown Oriole. – (Syn. *striata* Quoy & Gaim., 1830, nec *Shaw*, 1909, nec *Herm.*, 1783, *granti* Math., 1916).

Neuguinea u. Inseln Misol, Salawati, Batanta, Waigeu.

Mimeta phaeochroma (gray, 1860) – **Halmaherapirol**; E: Halmahera Oriole.

Halmahera (Molukken).

Mimeta bourouensis (Quoi & Gaim., 1830) – **Burupirol**; E: Buru Oriole.

Insel Buru (Molukken) u. Tenimber-Ins.

Subsp. (incl. *decipens*).

Mimeta viridifusca Heine, 1859 – **Finschpirol**; E: Timor Oriole – (Syn. *variegata* Gray, 1870, nec *Viell.*, 1817, nec *Bechst.*, 1811)

Inseln Timor u. Wetar.

Subsp. (incl. *finschi*)

Mimeta forsteni Bonap., 1850 – **Forstenpirol**; E: Seram Oriole.

Insel Seran (Ceram) (Molukken).

Mimeta flavocincta (King, 1826) – **Mangrovepirol**; E: Yellow Oriole (Green Oriole).

N-Australien (von NW-Westaustralien bis N-Queensland), S-Neuguinea, Aru-Ins., Inseln Leti, Moa u. Roma.

Subsp. (incl. *muelleri*).

Genus *Sphecotheres* Viell., 1816 (Syn. *Picnoramphus* Rosenberg, 1867)

Sphecotheres viridis Viell., 1816 – **Feigenpirol**; E: Green Figbird. – (Syn. *virescens*).

Inseln Timor u. Wetar, Kei-Inseln (Arafuren-See), N-Australien, Küstengebiet E-Australiens südwärts bis Sydney, S-Neuguinea.

Subsp. (incl. *hypoleucus* Finsch, 1898, *cucullatus* Rosenberg, 1876, *flaviventris* Gould, 1850, *vieilloti* Vig. & Horsf., 1827 = „*canicollis*“, *salvadorii* Sharpe, 1877, diese Rassen früher zum Teil als eigene Arten angesehen).
